

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO VETERINARIO,
NO ES MEDICAMENTO VETERINARIO

1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial: BOOSTER® RN
- 1.2. Clase de uso: Suplemento del Calostro para Terneros Recién Nacidos.
- 1.3. Formulación: Gel Nutricional.

2. COMPOSICION

Análisis Proximal:

Proteína cruda	: mínimo 18 %
Grasa cruda	: mínimo 0.243 %
Carbohidratos	: mínimo 33.3 %
Cenizas	: mínimo 5.85 %
Fibra	: mínimo 0.072%
Humedad	: mínimo 34.200%
Energía total	: mínimo 867.6 KJ/100g

Ingredientes:

Cada 30 mL de BOOSTER® RN contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Vitamina A (Retinol Acetato)	10 000	UI
Vitamina D3 (Colecalciferol)	4000	UI
Vitamina E (Alfa tocoferol acetato)	0,2	g
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	0,015	g
Vitamina B9 (Ácido fólico)	0,0009	g
Gluconato de Zinc	0,047	g
Gluconato de Cobre	0,014	g
Gluconato de Cobalto	0,004	g
Gluconato de Hierro	0,089	g
Selenito de sodio anhidro	0,001	g
Lactoferrina	0,2	g
Lactoperoxidasa	0,25	g
Probióticos	0,2	g
Calostro Bovino	7,5	g
Huevo Pasteurizado Deshidratado	5	g
Inulina	0,5	g
Fructooligosacárido	0,3	g
Dextrosa monohidratada	1	g
Excipientes c.s.p.	30	mL

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: Pasta semisólida.
- 3.2. Color: Rojo claro a marrón claro.

4. DESCRIPCIÓN

Su administración como primera línea de defensa, de manera inmediata (posterior al nacimiento); estimula el apetito y establece condiciones adecuadas de salud fomentando y optimizando la ingestión temprana de calostro materno y previniendo así la falla de transferencia pasiva (FTP).

Realiza su acción mediante la provisión de inmunoglobulinas (IgG bovina de calostro bovino y anticuerpos naturales del huevo), energía enzimas lácticas inhibidoras del crecimiento de gérmenes patógenos y una gran cantidad de elementos nutricionales (vitaminas, minerales, proteínas especiales, entre otros). Adicionalmente contiene una fuente de organismos ruminales vivos, productores de ácido láctico (probióticos) y prebióticos que ayudan el desarrollo adecuado del medio intestinal del recién nacido. De esta manera, BOOSTER® RN asegura el máximo beneficio del calostro materno.

5. INDICACIONES

Suplemento del calostro para terneros recién nacidos.

6. ESPECIES DE DESTINO

Terneros recién nacidos.

7. ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

8. DOSIS

1 jeringa en terneros recién nacidos. Administrar una jeringa adicional en dos dosificaciones (15 mL cada dosis) a las 6 y 12 horas después de la primera aplicación. Puede administrarse otras dosis de acuerdo a criterio del médico veterinario.

9. PRECAUCIONES

No precisa precauciones especiales.

10. CONTRAINDICACIONES

Ninguna

11. PERIODO DE RETIRO

BOOSTER® RN

Página 3 de 3

No requiere

12. ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente hasta 25°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado del alcance de los niños.

13. PRESENTACIÓN

Jeringas x 30 mL.