

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO VETERINARIO,  
NO ES MEDICAMENTO VETERINARIO

## 1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial: ChickVit<sup>®</sup> ADE + C OS
- 1.2. Clase de uso: Suplemento nutricional.
- 1.3. Formulación: Solución oral.

## 2. COMPOSICION

## Análisis Proximal:

Proteína cruda	: mínimo 2 %
Grasa cruda	: mínimo 4 %
Carbohidratos	: mínimo 0.15 %
Cenizas	: mínimo 1 %
Fibra	: mínimo 0.05 %

## Ingredientes:

Cada 100 mL de Chick Vit<sup>®</sup> ADE + C OS contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Vitamina A (como retinol palmitato)	5 000 000	U.I.
Vitamina D3 (como colecalciferol)	1 000 000	U.I.
Vitamina E (como alfa tocoferol acetato)	2 000	mg
Vitamina C (como ascorbato de sodio)	10 000	mg
Excipientes c.s.p.	100	mL

## 3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto: Solución translúcida.

Color: Amarillo claro a amarillo.

Complemento vitamínico balanceado. La vitamina A se asocia a la función epitelial, fertilidad y una visión adecuada. La vitamina D regula el metabolismo del calcio y fósforo. La vitamina E es un antioxidante intracelular, al igual que la vitamina C, que también es requerida para muchas funciones fisiológicas. Recomendado para animales jóvenes en crecimiento y durante los periodos de gestación, lactancia y producción.

### 4. DESCRIPCIÓN

Asociación microemulsionada y balanceada de vitaminas A, D y E, adicionada con vitamina C.

### 5. INDICACIONES

Está indicado en la prevención de la deficiencia de las vitaminas asociadas a la fórmula. Prevención o tratamiento de estrés (provocado por vacunación, enfermedades, transporte, alta humedad, altas temperaturas o cambios bruscos de temperatura). Mejora de índices reproductivos y productivos. Mejoramiento del índice de conversión, entre otros.

### 6. ESPECIES DE DESTINO

Aves, cerdos, bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, equinos, conejos, perros y gatos.

### 7. ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

### 8. DOSIS

Aves	:	1 litro por 4 000 litros de agua de bebida.
Cerdos	:	100 mL por 400 litros de agua de bebida. Directamente: 0.5-1 mL por lechón.
Vacunos, Equinos	:	5 - 10 mL
Terneros, Potros	:	3 - 4 mL
Ovinos, Caprinos, Camélidos	:	2 - 3 mL
Perros, gatos y otros animales menores	:	0.5 - 1 mL

### 9. PRECAUCIONES

El agua de bebida medicada debe de usarse en las primeras 24 horas.

### 10. CONTRAINDICACIONES

Ninguna

### 11. PERIODO DE RETIRO

No requiere

### 12. ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente hasta 25°C, en un lugar seco y bien ventilado, protegido de la luz y alejado del alcance de los niños.

### 13. PRESENTACIÓN

100 y 500 mL, 1L, 5L y 20L, disponibilidad de otras presentaciones comerciales.