

Cloxantel® 11

Solución oral

Antiparasitario interno y externo de larga acción

agrovetmarket s.a.

FORMULACION

Cada 100 mL contienen:

Cloxantel.....11 g

Excipientes.....c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

Cloxantel® 11, es un antiparasitario de amplio espectro, con acción sobre parásitos internos y externos; recomendado para el control y tratamiento de las parasitosis de bovinos, ovinos y camélidos sudamericanos; incluyendo casos de fasciola (alicuya) adultas e inmaduras.

Su poderosa y larga acción residual se debe a su extraordinaria unión a las proteínas plasmáticas (>99%) y su muy larga vida media en el plasma. Así elimina y protege contra reinfestaciones de los siguientes parásitos:

- *Fasciola hepatica*: Estadios adultos e inmaduros mayores a 4 - 8 semanas en ovinos y bovinos. Su larga acción mejora su eficacia eliminando las fasciolas recién maduras conforme ingresan a los conductos biliares.
- Gusanos gastrointestinales: *Haemonchus spp.*, inclusive los resistentes a otros antiparasitarios. Su larga acción protege a los ovinos de reinfestaciones hasta por 60 días. Además contra *Oesophagostomum spp.*, *Ostertagia spp.*, *Bunostomum spp.*, *Chabertia ovina*, *Capillaria spp.*, entre otros.
- Ectoparásitos: *Oestrus ovis* (gusano de la nariz), *Dermatobia hominis* (tupe), *Hypoderma spp.*, *Melophagus ovinus* (falsa garrapata). Protege contra miasis o gusanera (*Cochliomyia hominivorax*), piojos chupadores y previene la sarna ovina (*Psoroptes ovis*).

DOSIFICACION

Vía oral.

Bovinos de toda raza: Nemátodos gastrointestinales y *Fasciola hepatica*: 1 mL/11 kg peso vivo (10 mg/kg); Ectoparásitos: 1 mL/5.5 kg peso vivo (20 mg/kg).

Ovinos, camélidos sudamericanos: Nemátodos gastrointestinales y *Fasciola hepatica*: 1 mL/11 kg peso vivo (10 mg/kg); *Oestrus ovis*: 1 mL/22 kg peso vivo (5 mg/kg); Ectoparásitos y *Cochliomyia hominivorax* (gusaneras): 1 mL/5.5 kg peso vivo (20 mg/kg).

PERIODO DE RETIRO

Carne y leche: 30 días

PRECAUCIONES

No administrar más de 5 veces la dosis (50 mg/kg) pues pueden aparecer signos de toxicidad. No administrar junto a medicamentos clorados. En caso de sobredosificación, administrar albúmina como antídoto, diariamente vía intravenosa en una infusión al 20% diluida en una solución de NaCl al 0.9% en una proporción de 1 volumen de albúmina por 3 volúmenes de NaCl al 0.9% hasta la total recuperación.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Almacenar entre 8° y 30° C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Jeringa x 30 mL. Frasco x 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L.

Reg. SENASA Perú: F.09.02.N.0086

Cloxantel® es una marca registrada de:



Av. Canadá 392-3798, San Luis, Lima 30 - Perú
Tel.: (511) 435.2323- 719.0105 Fax: (511) 435.1833
Email:ventas@agrovetmarket.com - Web: www.agrovetmarket.com