

1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial : Colistix[®] WS
1.2. Clase de uso : Antibiótico
1.3. Formulación : Polvo soluble oral

2. COMPOSICION

Cada 100 g de Colistix WS contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Colistina Sulfato (eq. 3 millones UI)	100	mg
Excipientes c.s.p	1	g

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: polvo.
3.2. Color: blanquecino

4. DESCRIPCIÓN

Colistix WS es un potente Antibiótico Polipéptido para Infecciones Entéricas.

5. INDICACIONES

Tratamiento y prevención de las enfermedades entéricas causadas por microorganismos sensibles a la colistina y como promotor de crecimiento. Pollos, gallos y pavos: Tifosis aviar (*Salmonella gallinarum*), pulorosis (*Salmonella pullorum*), diferentes tipos de infecciones por *E. Coli*. Cerdos: enterotoxemia causada por *E. coli* (enfermedad del edema), colibacilosis entérica, salmonelosis, diarrea neonatal, diarrea de los lechones, diarrea post-destete, diarreas bacterianas secundarias. Terneros, corderos, cabritos, tuis: infecciones entéricas por *Salmonella spp*, diarreas causadas por *E. coli*, enterotoxemia, infecciones bacterianas secundarias luego de una infección viral.

6. ESPECIES DE DESTINO

Aves, porcinos, terneros, corderos, cabritos y tuis.

7. ADMINISTRACIÓN

Vía oral mezclado en el agua de bebida (también puede administrarse vía alimento).

8. DOSIS

Aves: 75,000 -100,000 UI/kg peso vivo/día (hasta 125,000 en casos muy graves), en la práctica:

- Preventivo: 100-200 g/1,000 L agua (o en 750 Kg de alimento) durante el período de riesgo, como promotor de forma continua.
- Terapéutico: 300 -400 g/1,000 L agua (o en 750 Kg de alimento) por 5-7 días.

Cerdos: 100,000 UI/kg peso vivo/día, en la práctica:

- Preventivo: 200-300 g/1,000 L agua (o en 500 Kg de alimento), durante el período de riesgo, como promotor de forma continua.
- Terapéutico: 300 -500 g/1,000 L agua (o en 500 Kg de alimento) por 5-7 días.

Terneros, tuis, corderos y cabritos: 2 veces al día, 1 g/50 Kg por 5-7 días (en agua, leche o alimento).

Cualquier factor que afecte el consumo puede hacer necesario modificar los niveles de inclusión. Consulte a su veterinario antes de iniciar cualquier tratamiento.

9. PRECAUCIONES

- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Mantener la limpieza en todo momento.
- No mezclar en el mismo envase con cualquier otra sustancia ajena al producto.
- No manipular este producto si sabe que es sensible o si se le ha aconsejado no trabajar con tales preparaciones.
- Agrovvet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.
- El agua medicada debería ser consumida dentro de las 24 horas, la leche medicada de forma inmediata y el alimento en 30 días
- No se han descrito reacciones adversas relacionadas con el uso de la Colistina sulfato por vía oral a las dosis recomendadas en las especies de destino. De todas formas, al tratarse de un antibiótico que actúa a nivel intestinal, pueden aparecer alteraciones digestivas como disbiosis intestinal, acumulación de gases o leves diarreas.
- Utilizar únicamente en terneros, corderos y cabritos prerrumiantes y tuis.
- La colistina administrada con tetraciclinas o amoxicilina genera efectos sinérgicos.

- Cuando se mezcle el medicamento veterinario y manipule el alimento medicado, se debe evitar el contacto directo con ojos, piel y mucosas. Lavar manos y la piel expuesta después del uso. En caso de contacto con los ojos, inmediatamente enjuagar con abundante agua. En caso de ingestión accidental o si aparecen síntomas, consulte inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.

10. CONTRAINDICACIONES

- No administrar a animales con afecciones renales severas.
- Sobredosis muy altas o periodos largos, pueden causar disfunción renal, deshidratación, neurotoxicidad y/o bloqueo neuromuscular.
- Evitar en animales con historial de hipersensibilidad.

11. PERIODO DE RETIRO

Carne: 1 día

Huevos: 0 días.

12. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz entre 15 y 30°C, alejado del alcance de los niños.

13. PRESENTACIÓN

10g, 15g, 25g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg.