1. GENERALIDADES

1.1. Nombre comercial: DIFLOVET® ORAL
1.2. Clase de uso: antibiótico.
1.3. Formulación: solución

2. COMPOSICION

Ingredientes:

Cada 100 mL de Diflovet® Oral contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Difloxacina (como clorhidrato)	10	g
Excipientes c.s.p.	100	mL

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

3.1. Aspecto: solución.
3.2. Color:

4. DESCRIPCIÓN

Solución oral que contiene difloxacina clorhidrato, una quinolona de tercera generación como sustancia activa

5. INDICACIONES

Indicado para la Enfermedad Respiratoria Crónica (E.R.C) causada por cepas sensibles de *Escherichia coli* y *Micoplasma gallisepticum* en pollos y pavos. También está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por *Pasteurella multocida* en pavos.

6. ESPECIES DE DESTINO

Aves de corral, ornamentales y de pelea.

7. ADMINISTRACIÓN

Vía oral, en el agua de bebida

8. DOSIS

La administración debe ser diaria con el agua de bebida a la dosis de 10 mg/kg de peso vivo.

DIiflvoet® Oral al estar al 10 % de difloxacina debe hacerse el siguiente cálculo para determinar cuántos mL por cada 1000 L de agua debe usarse:

Número de animales en el criadero x peso medio de cada animal (kg) x 100
Consumo total del agua del criadero del día anterior (litros)

1 vez al día por 5 días

9. PRECAUCIONES

- La solución debe prepararse cada día.
- No utilizar otra bandeja de bebida durante el periodo de medicación.
- No añadir cloro ni peróxido de hidrógeno al agua de bebida que se usa para la preparación de la solución medicada.
- No congelar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en lugar fresco y seco, en empaque bien cerrado y protegido de la luz.
- Mantener el producto en su envase original.
- La solución es irritante por lo que daña la piel; se recomienda usar equipo de protección (guantes, lentes, etc.).
- El fabricante no se responsabiliza por los daños y perjuicios derivados de un uso diferente al indicado.

10. CONTRAINDICACIONES

- No se debe utilizar en gallinas ponedoras.
- La difloxacina oral no debe ser usada en aves con problemas de artropatías u osteoporosis.
- Como con otros antibióticos, el uso de Diflovet® Oral, está contraindicado en animales con antecedentes de hipersensibilidad al principio activo.
- No administrar por otra vía que no sea la indicada.
- No administrar con antiinflamatorios no esteroides.

11. PERIODO DE RETIRO

Carne: 24 horas.
Huevos: No administrar a gallinas ponedoras en producción de huevos para consumo humano.

12. ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 15 °C y 30 °C. Mantener alejado de los niños.

13. PRESENTACIÓN

Bolsas x 100 g y bolsas con zuncho dentro de baldes plásticos por 1 kg y 5 kg y en bolsas por 10 kg, 20 kg y 25 kg dentro de cajas de cartón.