

ALTO, LEA EL INSERTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Ectomethrin® Pour On

Solución externa

Garrapaticida e Insecticida

agrovetmarket s.a.

FORMULACIÓN

Cada 100 mL contiene:

Cipermetrina..... 6.5 g

Excipientes.....c.s.p..... 100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y camélidos.

INDICACIONES

Indicado para el control y tratamiento de infestaciones de la "mosca de los cuernos" (*Haematobia irritans*), piojos chupadores y masticadores (*Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, entre otros) en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y camélidos; tratamiento y control de *Melophagus ovinus* y como repelente de *Stomoxys calcitrans* ("mosca brava"), tabánidos, otras moscas y mosquitos. Acción repelente contra insectos en general. Su acción residual es de entre 5 y 6 semanas. Es un poderoso antiparasitario externo, formulado especialmente para la aplicación pour on (línea media dorsal). Corresponde a un piretroide de comprobado efecto insecticida.

DOSIFICACIÓN

Esparcir la dosis en forma lineal desde la cruz hasta la zona lumbar.

Bovinos: 10 mL/animal. Para animales de más de 400 kg la dosis es de 20 mL/animal.

Ovinos, caprinos y camélidos (hasta 45 días post esquila): 5 mL/animal, luego de 45 días post esquila 6-7 mL/animal. Si el animal tiene lana larga, abrir el vellón y aplicar directamente sobre la piel.

Porcinos: 5 mL/animal.

Equinos: 20 mL/animal, repartida entre la línea media desde la cruz hasta el anca (10 mL) y 5 mL en cada ijara.

En casos de infestación severa, se puede aumentar la dosis de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

Aplicar con el dosificador del envase exclusivo **Pourmatic®**, derramando la dosis indicada sobre la piel limpia del dorso del animal, desde la cruz hasta la grupa. Repetir el tratamiento a los 35 días.

PERIODO DE RETIRO

Entre el último tratamiento y la faena o el destino de leche a consumo o industrialización deben transcurrir no menos de 48 horas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

No tiene incompatibilidades ni presenta toxicidad a las dosis indicadas. Evitar el contacto con la piel y mucosas por parte del operario. Luego de usar, lavarse las manos y las zonas expuestas con abundante agua y jabón. **LIGERAMENTE TÓXICO - EN CASO DE INGESTIÓN O INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MOSTRAR LA ETIQUETA Y/O CAJA.** No transportar ni almacenar junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

Sólo para uso externo. **NO APLICAR POR OTRA VÍA.** Al efectuar el tratamiento, es prudente evitar las horas de intenso calor, frío o la inminencia de lluvia. Consulte a su médico veterinario para determinar el momento más adecuado para el tratamiento.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 8°C y 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco x 30 mL., 250 mL., 500 mL. y 1 Litro.

Reg. SENASA Perú: F.07.08.N.0322;

Reg. Mauricio: DCCB/AC/6/13/640; Reg. Santa Lucía: 2009/003

Ectomethrin® es una marca registrada de



agrovetmarket
animalhealth

Av. Canadá 3792-3798, San Luis. Lima 30 - Perú

Tel.: (511) 2 300 300

Email: ventas@agrovetmarket.com - Web: www.agrovetmarket.com

Fabricado por Pharmadix Corp. S.A.C.

Av. Santa Lucía Nro. 218 - Urb. Ind. La Aurora - Ate. Lima- Perú