

Ectonil® Pour On

Solución externa
Garrapaticida e Insecticida

agrovvetmarket s.a.

FÓRMULA

Fipronil 1 g, excipientes c.s.p. 100 mL

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES

Tratamiento y control de la mosca de los cuernos, garrapatas, nuca (tupe o ura), piojos masticadores, chupadores y miasis (gusaneras).

ECTONIL® Pour On es un insecticida cuyo ingrediente activo es el fipronil (1% p/v), un derivado de los fenilpirazoles. Por ser un nuevo compuesto no relacionado con los ya existentes controla parásitos externos resistentes a otras moléculas como piretroides, organofosforados y amidinas.

Por su formulación (de bajo volumen y lista para su uso) al ser aplicado en el dorso de los animales se distribuye perfectamente por toda la piel y el pelo de los animales por tener afinidad hacia las glándulas sebáceas y sus secreciones.

BENEFICIOS

Alta eficacia contra cepas resistentes a piretroides y fosforados de la mosca de los cuernos y garrapatas. Facilidad de aplicación. Más control por más tiempo. Menos estrés por menos movimientos y baños. Más ganancia de peso. Seguridad para el animal y para la persona que lo aplica.

INDICACIONES

Está indicado para el tratamiento y control de los siguientes parásitos externos de los bovinos, ovinos, camélidos, equinos, cuyes: Garrapatas (*Boophilus microplus*), mosca del cuerno (*Haematobia irritans*) piojos masticadores (*Damalinea bovis*), piojos chupadores (*Linognathus vituli*) y miasis nodular (*Dermatobia hominis*); moscas (*Melophagus ovinus*) y aves: pulgas (*Echidnophaga gallinaceae*), piojos (*Menopon gallinae*, *Lipeurus caponis*) y ácaros (principalmente *Dermanyssus gallinae* o ácaro rojo).

DOSIFICACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación epicutánea.

Bovinos, ovinos, camélidos y equinos: La dosis recomendada es de 1 mL por cada 10 kg de peso vivo, correspondiente a 1 mg de fipronil por Kg. de peso vivo.

Cuyes y aves: La dosis recomendada es de 0.1 mL por Kg. de peso vivo, correspondiente a 1 mg de fipronil por Kg. de peso vivo, que en la práctica equivale a dos gotas por cada Kg de peso vivo, aplicado en el dorso.

Retirar la tapa, presionar levemente hasta que el exclusivo sistema Pourmatic® del frasco permita llenar la dosis requerida en la cámara superior. Aplicar topicalmente a lo largo de la línea dorsal que se extiende desde la cruz hasta la base de la cola.

Para resultados óptimos **ECTONIL® Pour On** debe aplicarse a todos los animales del hato dentro de un programa planificado de control de parásitos externos.

El intervalo de tratamiento puede ser de al menos 2 meses pero dependerá de la severidad de la infestación, condiciones ambientales y condiciones del centro de crianza. Consulte a su Veterinario para determinar el momento más adecuado para el tratamiento.

PERÍODO DE RETIRO

Carne: 100 días. No usar en animales productores de leche para consumo humano. No usar en vaquillonas destinadas a la producción láctea durante los tres meses previos al parto.

RESTRICCIONES DE USO

Sólo para uso externo. NO APLICAR POR OTRA VÍA.

CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y PRECAUCIONES

- No presenta efectos secundarios ni incompatibilidades.
- Aplicar el producto al animal en un espacio ventilado.
- No utilizar en animales enfermos o convalecientes.

- No aplicar en zonas de la piel con heridas.

PRECAUCIONES DE USO

No reutilizar el envase vacío. Evite contaminar cursos de agua como ríos, arroyos, etc. Lavar las manos y piel expuesta luego del uso. De existir contacto directo con la piel, lavar con abundante agua y jabón. De existirlo en los ojos, hacerlo con abundante agua durante 15 minutos. Si se ingiriese, beber grandes cantidades de agua, acudiendo de inmediato al médico con esta etiqueta. Si existiese intoxicación, llevar de inmediato a emergencia y mostrar esta etiqueta al médico. No existe antídoto específico. **Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.**

MEDIDAS ADICIONALES

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar, lejos de alimentos, productos de higiene y medicamentos. Almacenar entre 15° y 30° C. No contaminar agua, comida, alimentos con el producto o el envase lleno o vacío. Almacenar en su envase original. Envuelva el frasco en varias hojas de papel y arrójelos a la basura, nunca al agua pues afecta animales acuáticos.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco tipo gotero x 30 mL, frasco x 120 mL, 500 mL y 1 L.

Reg. SENASA Perú: F.07.03.N.0281; Reg. Costa Rica: Reg. MAG PE10-43-06-3405;
Reg. Ecuador: 3B1-3-9149-AGRO CALIDAD; Reg. Guatemala: PE208-43-02-1220;
Reg. Honduras: PF-3874; Reg. Nicaragua: 6889; Reg. Panamá: RF-3332-05;
Reg. Rep. Dominicana: 5634; Reg. Venezuela: MAT-SASA-P.I.11.393

Ectonil® es marca registrada de:



agrovvetmarket
animalhealth

Av. Canadá 3792-3798, San Luis. Lima 30 - Perú
Central Telefónica: (511) 435.2323- 719.0105 Fax: (511) 435.1833
Email: ventas@agrovvetmarket.com Web: www.agrovvetmarket.com