

# FBZ® 12.5% con Minerales

Suspensión Oral  
Antiparasitario interno

agrovvetmarket s.a.

## FORMULACIÓN

Cada 100 mL contiene:

Fenbendazole.....	12,5 g
Sulfato de Cobalto.....	1,6 g
Carbonato de Zinc.....	0,6 g
Selenito de Sodio.....	0,3 g
Excipientes.....c.s.p.....	100 mL

## INDICACIONES

**FBZ 12.5% con minerales**, es un antiparasitario de amplio espectro; para el control y tratamiento de las parasitosis internas de bovinos, equinos, ovinos, camélidos y caprinos; incluyendo casos de teniasis. Incluye en su fórmula minerales con acción directa en la prevención de anemias (cobalto), en la mejora del pelaje, piel y lana (zinc) y mejora en la reproducción (selenio).

Su acción incluye formas maduras e inmaduras (incluyendo estadios inhibidos y huevos) de:

- Gusanos del estómago: *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp. y *Trichostrongylus axei*.
- Intestinales: *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides* spp., *Ostertagia* spp. (incluidos sus estados hipobioticos), entre otros.
- Pulmonares: *Dictyocaulus* spp.
- Tenias: *Moniezia* spp.

## DOSIFICACIÓN

Via oral.

Bovinos de toda raza: Nemátodos gastrointestinales y pulmonares: 1 mL/25 kg (5 mg/kg). Tenias: 1 mL/12.5 kg (10 mg/kg). Larvas *Ostertagia* tipo II (hipobioticas): 1 mL/16 kg de peso vivo (7.5 mg/kg).

Caprinos, ovinos, camélidos: Nemátodos gastrointestinales y pulmonares: 1 mL/25 kg (5 mg/kg). Tenias: 1 mL/12.5 kg (10 mg/kg). Larvas *Ostertagia* tipo II (hipobioticas): 1 mL/16 kg de peso vivo (7.5 mg/kg).

Equinos: 1 mL/16 kg de peso vivo (7.5 mg/kg).

## PERIODO DE RETIRO

Carne: 14 días  
Leche: 3 días.

## CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y PRECAUCIONES

- ⊗ No se han reportado contraindicaciones ni limitaciones de uso cuando el producto se administra en la dosis recomendada. El producto es muy bien tolerado. Es compatible con otros antihelmínticos.
- ⊗ En perros en alta dosis puede producir vómitos, anorexia y diarrea.
- ⊗ No administrar conjuntamente con los derivados bromados de la salicilililidad.
- ⊗ No se recomienda su uso en animales debilitados, muy parasitados o en simultáneo con otras medicaciones, baños o vacunaciones.
- ⊗ Agítese antes de usar.
- ⊗ Mantener fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.

## ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Almacenar entre 8° y 30° C.

## PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco x 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L. Jeringa dosifácil x 30 mL.

Reg. SENASA Perú: F.08.02.N.0411; Reg. Ecuador: 3A1-10452-AGROCALIDAD;  
Reg. Guatemala: 19-29-189-10981; Reg. Honduras: PF-3879; Reg. Nicaragua: 8167;  
Reg. Rep. Dominicana: 6199; Reg. Venezuela: MAT-SASA- M.111.827;

FBZ® es una marca registrada de:



agrovvetmarket  
animal health

Av. Canadá 392-3798, San Luis, Lima 30 - Perú  
Tel.: (511) 2 300 300

Email:ventas@agrovvetmarket.com - Web: www.agrovvetmarket.com

Fabricado por Pharmadix Corp. S.A.C.  
Av. Santa Lucía 218 - Urb. Ind. La Aurora - Ate. Lima - Perú