

## ANTIBIÓTICO DE USO VETERINARIO

## 1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial: Moxidec Onyx
- 1.2. Clase de uso: Antiparasitario.
- 1.3. Formulación: Solución inyectable.

## 2. COMPOSICION

Cada 1 mL de Moxidec® Onyx contiene:

Ingredientes	Cantidad	Unidad
Ingrediente(s) activos:		
Moxidectina	100.00	mg
Ingrediente inactivo:	1	mL

## 3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: Solución traslúcida.
- 3.2. Color: Amarillo claro a amarillo.

## 4. DESCRIPCIÓN

Antiparasitario Interno y Externo de Amplio Espectro.

## 5. INDICACIONES

Es un endectocida que posee actividad tanto para parásitos internos (nematodos) como para parásitos externos (artrópodos). Todos los parásitos gastrointestinales mayores, nemátodos pulmonares de rumiantes domésticos, y algunos parásitos artrópodos de rumiantes.

## AGENTES SUCEPTIBLES:

Parásitos Gastrointestinales: (estadios adultos e inmaduros)

*Ostertagia ostertagi* (incluido su estadio hipobiótico); *Ostertagia lyrata*; *Haemonchus placei*; *Haemonchus contortus*; *Trichostrongylus axei*; *Trichostrongylus colubriformis*; *Cooperia punctata*; *Cooperia pectinata*; *Cooperia oncophora*; *Cooperia spatulata*; *Oesophagostomum radiatum*; *Nematodirus spathiger*; *Bunostomum phlebotomum*; *Trichuris discolor*; *Chabertia ovina*

## MOXIDEC® ONYX

Página 2 de 2

Gusano Pulmonar: *Dictyocaulus viviparus*; *Dictyocaulus filaria*.

Parásitos externos:

Sarna: *Psoroptes bovis*, *Psoroptes ovis*

Piojos: *Linognathus vituli*; *Haematopinus eurysternus*; *Solenopotes capillatus*.

Garrapata: *Boophilus microplus*,

Dípteros: *Hypoderma sp.*, *Oestrus ovis*

### 6. ESPECIES DE DESTINO

La fórmula está desarrollada para su uso en bovinos y ovinos, caprinos.

### 7. ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea en la superficie dorsal del tercio proximal de la oreja del animal.

### 8. DOSIS

1 mL cada 100 kg de peso vivo

### 9. PRECAUCIONES

- Almacenar entre 15°C y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Mantener la limpieza en todo momento.
- Agroveter Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.
- Tras administración subcutánea pueden darse hinchazón en el lugar de la inyección.

### 10. CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a la Moxidectina.
- No debe administrarse Moxidectina a bovinos jóvenes de menos de 8 semanas de edad.
- No usar en ovejas de menos de 15 kg
- No usar por otra vía que no sea la indicada.
- No mezclar en el mismo envase con cualquier otra sustancia ajena al producto.
- No manipular este producto si sabe que es sensible o si se le ha aconsejado no trabajar con tales preparaciones.

### 11. PERIODO DE RETIRO

- 73 días.
- No para uso en animales cuya leche sea destinada para consumo humano.

### 12. ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 15° y 30°C. Mantener alejado de los niños.

### 13. PRESENTACIÓN

El producto se presenta en frascos plásticos de 10, 20, 50, 100, 250 y 500 mL.