

ANTIBIÓTICO DE USO VETERINARIO

1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial: Moxidec Onyx
- 1.2. Clase de uso: Antiparasitario.
- 1.3. Formulación: Solución inyectable.

2. COMPOSICION

Cada 1 mL de Moxidec® Onyx contiene:

Ingredientes	Cantidad	Unidad
Ingrediente(s) activos:		
Moxidectina	100.00	mg
Ingrediente inactivo:	1	mL

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: Solución traslúcida.
- 3.2. Color: Amarillo claro a amarillo.

4. DESCRIPCIÓN

Antiparasitario Interno y Externo de Amplio Espectro.

5. INDICACIONES

Es un endectocida que posee actividad tanto para parásitos internos (nematodos) como para parásitos externos (artrópodos). Todos los parásitos gastrointestinales mayores, nemátodos pulmonares de rumiantes domésticos, y algunos parásitos artrópodos de rumiantes.

AGENTES SUCEPTIBLES:

Parásitos Gastrointestinales: (estadios adultos e inmaduros)

Ostertagia ostertagi (incluido su estadio hipobiótico); *Ostertagia lyrata*; *Haemonchus placei*; *Haemonchus contortus*; *Trichostrongylus axei*; *Trichostrongylus colubriformis*; *Cooperia punctata*; *Cooperia pectinata*; *Cooperia oncophora*; *Cooperia spatulata*; *Oesophagostomum radiatum*; *Nematodirus spathiger*; *Bunostomum phlebotomum*; *Trichuris discolor*; *Chabertia ovina*

Gusano Pulmonar: *Dictyocaulus viviparus*; *Dictyocaulus filaria*.

Parásitos externos:

Sarna: *Psoroptes bovis*, *Psoroptes ovis*

Piojos: *Linognathus vituli*; *Haematopinus eurysternus*; *Solenopotes capillatus*.

Garrapata: *Boophilus microplus*,

Dípteros: *Hypoderma sp.*, *Oestrus ovis*

6. ESPECIES DE DESTINO

La fórmula está desarrollada para su uso en bovinos y ovinos, caprinos.

7. ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea en la superficie dorsal del tercio proximal de la oreja del animal.

8. DOSIS

1 mL cada 100 kg de peso vivo

9. PRECAUCIONES

- Almacenar entre 15°C y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Mantener la limpieza en todo momento.
- Agroveter Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.
- Tras administración subcutánea pueden darse hinchazón en el lugar de la inyección.

10. CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a la Moxidectina.
- No debe administrarse Moxidectina a bovinos jóvenes de menos de 8 semanas de edad.
- No usar en ovejas de menos de 15 kg
- No usar por otra vía que no sea la indicada.
- No mezclar en el mismo envase con cualquier otra sustancia ajena al producto.
- No manipular este producto si sabe que es sensible o si se le ha aconsejado no trabajar con tales preparaciones.

11. PERIODO DE RETIRO

- 73 días.
- No para uso en animales cuya leche sea destinada para consumo humano.

12. ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 15° y 30°C. Mantener alejado de los niños.

13. PRESENTACIÓN

El producto se presenta en frascos plásticos de 10, 20, 50, 100, 250 y 500 mL.