Otiderma-Cef®

Suspensión ótica - dérmica

Combinación antibiótica-antiinflamatoria

agrovetmarket s.a.

FORMULACIÓN

Cada 10 mL contiene:

Cefalexina monohidrato, (Base)…….....	200.00 mg
Gentamicina	100.00 mg
Dexametasona fosfato sódico……..…….....	0.75 mg
Vitamina A Palmitato.....	10 000 UI
Excipientes…….....c.s.p.....	10 mL

INDICACIONES

Otiderma-Cef® está indicado para el tratamiento de problemas óticos y dérmicos, asociados a alergias y/o a organismos susceptibles a la gentamicina y/o cefalexina.

Otiderma-Cef® es de gran ayuda en el tratamiento de condiciones como otitis externa aguda y crónica, dermatitis y piodermas. Así también, está indicado como tratamiento de pequeños cortes, heridas, laceraciones, abrasiones o cuando se necesite reducir la inflamación y el dolor.

La adición de dexametasona, le otorga un rápido efecto antiinflamatorio, reduciendo además los signos de dolor y malestar en el animal, permitiendo una mejor llegada de los antibióticos al foco de la infección, lo cual brinda un mayor efecto terapeútico y control efectivo.

Además, **Otiderma-Cef®** contiene Vitamina A, que actúa como regenerador epitelial en animales con infecciones o inflamaciones debidas a microorganismos patógenos, asimismo, reduce las consecuencias del proceso infeccioso y participa manteniendo la integridad de los tejidos.

ESPECIE DE DESTINO

La fórmula está desarrollada para su uso en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos, caninos, felinos y conejos.

AGENTES SUSCEPTIBLES

In vitro, la gentamicina actúa contra gran variedad de gram-positivas y gram-negativas. Específicamente es activa contra los siguientes microorganismos: *Alcaligenes* spp., *Citrobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp., *Escherichia coli*, *Enterobacter* spp., *Staphylococcus* spp. y *Streptococcus* spp.

La Cefalexina es activa contra: *Staphylococcus* spp. (incluyendo cepas penicilina resistentes), *Streptococcus* spp., *Corynebacterium* spp., *Pasteurella* spp., *Escherichia coli*, *Proteus* spp., *Micrococcus* spp., *Moraxella* spp., *Actinobacillus ligneresii, Actinomyces bovis, Haemophilus* spp., *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Clostridium* spp., *Salmonella* spp., *Fusobacterium* spp., *Peptostreptococcus* spp. y *Peptococcus* spp.

VÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN O APLICACIÓN

Problemas óticos: Se recomienda antes de la aplicación del producto realizar la limpieza del canal auditivo, secar y verificar que no haya material extraño o detritus. Agitar el producto. La jeringa presenta una cánula larga la cual ofrece la posibilidad de realizar una aplicación profunda y sin ocasionar daño ya que posee un extremo romo. Aplicar **Otiderma-Cef®** directamente en el canal auditivo. Una vez aplicado proporcione un ligero masaje en la base de la oreja para que el medicamento se adhiera a las paredes y se distribuya.

Problemas de piel: Para usar en la piel o membranas mucosas, limpiar el área afectada, aplicar una pequeña cantidad de la suspensión y distribuir uniformemente o frotar con cuidado.

DOSIFICACIÓN

Para tratar otitis externa y otras condiciones inflamatorias del oído externo, llenar el canal auditivo externo con una cantidad suficiente de la suspensión hasta completar el área tratada.

Para el uso en piel o en membranas mucosas, limpiar el área afectada y aplicar una pequeña cantidad de la suspensión, distribuir o frotar suavemente.

Intervalo entre dosis: El tratamiento debe realizarse de 1 a 3 veces al día, dependiendo del criterio del Médico Veterinario.

Duración mínima del tratamiento: Esta varía de acuerdo a la etiología y a la respuesta del curso de la enfermedad, que puede variar de 2 a 6 semanas, dependiendo del criterio del Médico Veterinario.

EFECTOS COLATERALES E INCOMPATIBILIDADES

No se han encontrado reacciones adversas de ningún tipo en la aplicación tópica de los componentes de **Otiderma-Cef®**. Sin embargo, debe ser administrado con cautela a animales que han demostrado alguna forma de alergia, particularmente a la penicilina. Tales reacciones son muy raras; no obstante, de presentarse, descontinuar el tratamiento y consultar con su veterinario.

La gentamicina puede producir enrojecimiento local. Por vía inyectable u oral, en caso de insuficiencia renal y en tratamientos prolongados, se debe considerar como oto y nefrotóxico.

No combinar con tetraciclinas, eritromicina, cloranfenicol, debido a que antagonizan el efecto antibiótico.

CONTRAINDICACIONES

- No presenta

PERIODO DE RETIRO

- Carne : 48 horas
- Leche: 48 horas

PRECAUCIONES

- Dada la naturaleza del empaque y la no-reabsorción del principio activo, **Otiderma Cef®** presenta un amplio margen de seguridad, imposibilitando una sobredosis.
- El producto no ha mostrado afectar la gestación.
- No administrar el contenido de la jeringa si la cubierta protectora se encontrara dañada o rota.
- Preservar en la unidad de dosificación correspondiente (jeringas) bien cerradas y protegidas de la luz solar directa. Almacenar entre 8° y 30° C.
- Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
- Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Jeringa por 15 mL.

Reg. SENASA Perú: F.71.03.N.0014; Reg. Albania: 1722;
Reg. Guatemala: PE200-41-06-1489;
México: Reg. SAGARPA Q-0616-010 ; Reg. Moldavia: 2053;
Reg. Nicaragua: 8803; Reg. Panamá: RF-5678-11; Reg. Rep. Dominicana: 6599; Reg. Ecuador: 2C4-12974-AGROCALIDAD.

Otiderma - Cef® es una marca registrada de

agrovetmarket
animalhealth

Av. Canadá 3792-3798, San Luís. Lima 30 - Perú
Tel.: (511) 2 300 300
Email: ventas@agrovetmarket.com - Web: www.agrovetmarket.com

Fabricado por Pharmadix Corp. S.A.C.
Av. Santa Lucía Nro. 218 - Urb. Ind. La Aurora – Ate. Lima- Perú

42020119235799

V 10.02/14