

1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial : Tylamox[®] WS
1.2. Clase de uso : Antibiótico
1.3. Formulación : Polvo soluble

2. COMPOSICION

Cada 100 g de Tylamox WS contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Tilosina (como tartrato)	50	g
Amoxicilina (como trihidrato)	10	g
Excipientes c.s.p	100	g

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: polvo.
3.2. Color: ligeramente amarillo.

La asociación de un macrólido más una penicilina semisintética de amplio espectro, ofrece ventajas terapéuticas, en especial cuando se sospecha de infecciones mixtas, debido a que la cobertura de sus principios activos se amplía, y la población causante de la infección primaria y secundaria es afectada en diferentes estadios. La combinación de ambos antibióticos es un arma valiosa para el tratamiento de enfermedades respiratorias de las vías altas, incluyendo micoplasmosis.

4. DESCRIPCIÓN

Tylamox WS es una asociación antibiótica sinérgica macrólido – penicilina semi sintética.

5. INDICACIONES

Tratamiento y prevención de los procesos infecciosos causados por microorganismos sensibles a la tilosina y amoxicilina. La asociación actúa de manera aditiva y sinérgica.

Tylamox[®] WS

Página 2 de 3

La amoxicilina ofrece un amplio espectro con efecto bactericida contra bacterias Gram (+) y Gram (-). El espectro de efectos incluye *Campylobacter*, *Clostridium*, *Corynebacterium*, *E. coli*, *Pasteurella*, *Salmonella*, penicilinasas negativa estafilocócica y *Streptococo spp.*

La tilosina es un macrólido antibiótico de acción bacteriostática principalmente contra bacterias Gram (+) tales como *Campylobacter*, *Mycoplasma*, *Pasteurella*, *Estafilococo*, *Streptococo* y *Treponema spp.*

6.

7. ESPECIES DE DESTINO

Aves y terneros

8. ADMINISTRACIÓN

Vía oral en agua de bebida o alimento.

9. DOSIS

Aves: 100-150 mg/Kg p.v.

Como referencia usar la siguiente dilución: 0.5 – 1 Kg/1000-2000L de agua durante 3-5 días dependiendo de la edad del animal.

Terneros: 1.6 g/20 Kg de p.v.

10. PRECAUCIONES

- Cambiar el agua a diario
- Siempre agregue el agua al polvo, nunca el polvo al agua.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Mantener la limpieza en todo momento.
- No mezclar en el mismo envase con cualquier otra sustancia ajena al producto.
- No manipular este producto si sabe que es sensible o si se le ha aconsejado no trabajar con tales preparaciones.
- Agroveter Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.

11. CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a los principios activos
- No usar en caballos y otros solípedos.
- No para uso en aves productoras de huevo para consumo humano

12. PERIODO DE RETIRO

Carne:

- Aves: 2 días
- Terneros: 25 días
- Huevos: no usar en animales productores de huevos

13. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz entre 15 y 30°C, alejado del alcance de los niños.

14. PRESENTACIÓN

10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg.