1. GENERALIDADES

1.1. Nombre comercial : Zoovit® Bolus

1.2. Clase de uso : Suplemento

1.3. Formulación : Bolo

2. COMPOSICION

Cada bolo de Zoovit® Bolus contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Vitamina A	2'000,000	UI
Vitamina D3	10,000	UI
Vitamina E	600	mg
Vitamina B1	60	mg
Vitamina B2	40	mg
Vitamina B6	40	mg
Vitamina C	100	mg
Ácido Fólico	40	mg
Ácido Nicotínico	100	mg
Pantotenato de Calcio	60	mg
Biotina	0.4	mg
Vitamina B12	0.3	mg
Calcio	1800	mg
Hierro	80	mg
Zinc	24	mg
Fósforo	1000	mg
Cobre	2	mg
Manganeso	8	mg
Selenio	0.2	mg
Cobalto	15	mg

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

3.1. Aspecto: Bolo

3.2. Color: marrón

3.3. Peso promedio: 18 g

4. DESCRIPCIÓN

Zoovit® Bolus es un suplemento vitamínico que contiene vitaminas y minerales que garantiza suplir las necesidades diarias de vitamínicas y minerales en animales de producción.

5. INDICACIONES

Indicado en animales jóvenes en la fase de crecimiento más rápido, en animales con altos resultados productivos, en el periodo de fertilidad y lactancia, para reducir el estrés y como terapia de apoyo en varias enfermedades de engorde, infecciosas y parasitarias. Además, en hipo y avitaminosis, miopatía degenerativa, distrofia del hígado, raquitismo, osteomalacia, tetania, queratitis, esterilidad y convalecencia.

Mejora la tasa de utilización de los nutrientes en los alimentos (proteínas, grasas, celulosa), mejora la capacidad de resistencia a las enfermedades, promueve el crecimiento y el desarrollo.

6. ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, Equinos, Caprinos, Ovinos, Camélidos y Porcinos.

7. ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

8. DOSIS

<u>En general:</u>

- Animales adultos: 1 - 2 bolos.
- Neonatos: ½ - 1 bolo.

<u>Dosificaciones específicas:</u>

- Terneros y potros:

  ½ - 1 bolo, si es posible, dentro de las 6 horas después del nacimiento.

  ½ - 1 bolo en el séptimo día o quince días.
- Bovinos:

  1 - 2 bolos, 1 semana antes del parto.
- Yeguas:

  1 bolo, 1 semana antes del parto.
- Caballos y camellos:

  2 bolos de 1 - 2 semanas antes de la cubrición.

  2 bolos durante el trabajo o la competencia.
- Corderos y tuis:

½ bolo, si es posible, dentro de las 6 horas después del nacimiento.

½ bolo el séptimo día o el día quince.

- Ovejas, cabras y alpacas:

  1 bolo de 1 - 2 semanas antes del destete.

  1 bolo antes del parto.

- Lechones:

  1 – 2 bolos 1 o 2 semanas antes del destete

  ½ - 1 bolo antes de comenzar el engorde.

- Marranas:

  1 bolo 1 semana antes del parto.

  1 - 2 bolos inmediatamente después del parto.

9. PRECAUCIONES & CONTRAINDICACIONES

   No precisa precauciones especiales.

10. ALMACENAMIENTO

    Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz entre 15°C y 30°C, alejado del alcance de los niños.