

VERMOSANTEL

Suspensión Oral



Composición

Closantel 10 g

Indicaciones

Bovinos: Nemátodos (adultos y formas larvarias L3 y L4 de: Haemonchus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp. Trichostrongylus spp., Ostertagia spp, Chabertia spp.). Tremátodos (Fasciola hepatica, Paramphistomum spp.). Ectoparásitos: Dermatobia hominis, Haematopinus eurysternus, Solenoptes capillatus, Lignonathus vitulli. Preventivo de la Cochliomyia hominivorax y de la Callitroga spp. Ovinos y camélidos: Nemátodos (adultos y formas larvarias L3 y L4 de: Haemonchus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Cooperia spp., Trichostrongylus spp., Ostertagia spp.). Tremátodos (Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Paramphistomum spp.) . Ectoparásitos: Melophagus ovinus, Oestrus ovis. Preventivo de la Cochliomyia spp. o Callitroga spp. Equinos: Endoparásitos (Strongylus vulgaris, Strongylus equinus, Strongylus edentatus, Triodontophorus spp., Parascaris equorum, Oxiurus equi, Anaplocephala perfoliata; estadios larvarios de Gasterophilus nasalis, Gasterophilus intestinalis.

Dosis

Por vía oral. Bovinos, ovinos y camélidos: 10 mg/kg p.v. contra Fasciola hepatica y endoparasitos. Ectoparásitos: 15 a 20 mg/kg p.v. (repetir a los 7 días). Como preventivo repetir a los 7 días. Equinos: 20 mg/kg p.v. Las dosis se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

Presentaciones

Galonera 3.8 L, Frasco 1 L, Frasco 200 mL,

Vías Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.08.36.N.0723

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Hepáticos (trematodos-fasciola)

Web Site

http://biovetperu.com/wp/?page_id=354

Biovet Perú

