

VERMOSANTEL

Suspensión Oral



Composición

Closantel 10 g

Indicaciones

Bovinos: Nemátodos (adultos y formas larvarias L3 y L4 de: *Haemonchus* spp., *Bunostomum* spp., *Oesophagostomum* spp., *Trichostrongylus* spp., *Ostertagia* spp., *Chabertia* spp.). Tremátodos (*Fasciola hepatica*, *Paramphistomum* spp.). Ectoparásitos: *Dermatobia hominis*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Lignonathus vitulli*. Preventivo de la *Cochliomyia hominivorax* y de la *Callitroga* spp. Ovinos y camélidos: Nemátodos (adultos y formas larvarias L3 y L4 de: *Haemonchus* spp., *Bunostomum* spp., *Oesophagostomum* spp., *Cooperia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Ostertagia* spp.). Tremátodos (*Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*, *Paramphistomum* spp.). Ectoparásitos: *Melophagus ovinus*, *Oestrus ovis*. Preventivo de la *Cochliomyia* spp. o *Callitroga* spp. Equinos: Endoparásitos (*Strongylus vulgaris*, *Strongylus equinus*, *Strongylus edentatus*, *Triodontophorus* spp., *Parascaris equorum*, *Oxiurus equi*, *Anaplocephala perfoliata*; estadios larvarios de *Gasterophilus nasalis*, *Gasterophilus intestinalis*.

Dosis

Por vía oral. Bovinos, ovinos y camélidos: 10 mg/kg p.v. contra *Fasciola hepatica* y endoparasitosis. Ectoparásitos: 15 a 20 mg/kg p.v. (repetir a los 7 días). Como preventivo repetir a los 7 días. Equinos: 20 mg/kg p.v. Las dosis se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

Presentaciones

Galonera 3.8 L, Frasco 1 L, Frasco 200 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.08.36.N.0723

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Hepáticos (trematodos-fasciola)

Web Site

http://biovetperu.com/wp/?page_id=354

Biovet Perú

