

AMOXIDES G L.A

Solución Inyectable



Composición

Amoxicilina, trihidrato 15 g
Dexametasona, (21) fosfato sódica 0.15 g
Gentamicina, sulfato 4 g

Indicaciones

Bovinos y ovinos: Neumonías, diarreas, mastitis, metritis, actinomicosis, actinobacilosis, salmonelosis, pasteurelisis, infecciones del cordón umbilical, fiebre del embarque, neumoenteritis en terneros, artritis, e infecciones sistémicas. Equinos: Neumonías, adenitis equina, abscesos, infecciones genitales y urinarias. Porcinos: Diarreas causadas por E. coli, salmonelosis, síndrome MMA, artritis, enfermedades respiratorias y sistémicas. Aves: Colisepticemia, colibacilosis, E.R.C., salmonelosis, clostridiosis, coriza infecciosa, pasteurelisis y septicemias. Caninos y felinos: Septicemias, diarreas, neumonías y artritis.

Dosis

1 mL de AMOXIDES G L.A. /10 kg p.v. Si fuera necesario repetir a las 48 horas. Bovinos, equinos, ovinos y porcinos: Vía IM profunda. En dosis altas se recomienda utilizar más de un punto de aplicación repartiendo la dosis para favorecer su absorción. Aves: Vía SC. Caninos y felinos: Vía SC o IM. PERIODO DE RETIRO Carne: 25 días. Leche y huevo: 4 días.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.71.01.N.0040

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeutas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/amoxides-g-l/>

Drogavet

