

BRONCOX D SOLUCIÓN INYECTABLE®

Solución Inyectable



Composición

Doxiciclina 20 g
Tilosina, tartrato 5 g

Indicaciones

BRONCOX D Solución inyectable es una combinación de dos antibióticos bacteriostáticos sinérgicos, de acción rápida y prolongada. • Bovinos: Neumoenteritis, neumonía, Difteria, infecciones podales y Metritis. • Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: Pleuroneumonía, metritis, Agalactia. • Porcinos: Neumonía enzoótica, Artritis micoplásmica, Disentería Vibriónica, Erisipela y metritis. • Aves: Micoplasma, E.R.C., síndromes respiratorios, Colisepticemia, Coriza Infecciosa, Cólera aviar.

Dosis

Bovinos: 1 ml de BRONCOX D Solución Inyectable / 20 kg p.v. por día, durante 3 días. Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 ml de BRONCOX D Solución Inyectable / 40 kg p.v. por día, durante 3 días. Porcinos: 1 ml de BRONCOX D Solución Inyectable / 40 kg p.v. por día, durante 3 días. Aves: 1 ml de BRONCOX D Solución Inyectable / 20 kg p.v. por día, durante 3 días. Aves: (pollos, gallinas y pavos): 5 días Bovinos: Carne, 21 a 30 días; Leche, 5 días Porcinos: 14 días. Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 21 a 30 días.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.03.01.N.1258

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01R COMBINACIÓN DE ANTIBACTERIANOS
QJ01RA Combinación de antibacterianos
QJ01RA91 macrólidos, combinaciones con otros antibacterianos

Clases Farmacoterapeutas

Antibacterianos (antibióticos)
Macrólidos
Tetracilinas
Asociación de grupos antibióticos

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/broncoxd-iny/>

Drogavet

