BRONCOX D SOLUCIóN ORAL ®

Drogavet

Solución Oral



Composición

Doxiciclina 20 g
Tilosina, tartrato 5 g

Indicaciones

Solución Oral: Esta indicado en aves y porcinos. Aves (pollos, gallinas y pavos): Infecciones por Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma sinoviae, Mycoplasma meleagridis; E.R.C., síndromes respiratorios, colibacilosis, colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar, clostridiosis. Porcinos: Neumonía enzoótica, Pasteurella multocida y Corynebacterium pyogenes; erisipelas causadas por Erysipelothrix rhusiopathiae; rinitis atrófica y disentería porcina. Artritis causada por Mycoplasma hyosynoviae y Staphylococcus spp.

Dosis

Vía oral en el agua el agua de bebida. Tratamiento: - 0.1 mL de BRONCOX D® Solución Oral por kg de peso vivo por día, o 1 litro de BRONCOX D® Solución Oral para 1000 litros de agua, durante 3 a 5 días. Control de Micoplasma: - Se recomienda administrar la dosis tratamiento durante de 5 a 7 días por mes, a criterio del médico veterinario. PERIODO DE RETIRO Aves: 5 días. Porcinos: 8 días.

Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.03.32.N.1716

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Macrolidos
Tetracilinas

Web Site

http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/broncox-d-solucion-oral/

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com