

CIPRODROG 20%

Solución Oral



Composición

Ciprofloxacina 20 g

Indicaciones

Esta indicado en aves y cerdos para el tratamiento de enfermedades de origen bacteriano. Su espectro de acción comprende microorganismos como *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Mycoplasma meleagridis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus sp.*, *Pasteurella sp.*, *Salmonella sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Pasteurella haemolytica*, *Escherichia coli* (ERC), *Avibacterium paragallinarum* (Coriza infecciosa), *Pasteurella multocida* (Cólera aviar).

Dosis

Administrar vía oral en el agua de bebida. Aves: 0.5 mL de CIPRODROG 20%® / litro de agua, o 1 mL de CIPRODROG 20%® / 20 kg p.v. por día, durante 3 a 5 días. Porcinos: 1 mL CIPRODROG 20%® / 32 kg p.v. durante 3 a 5 días. PERIODO DE RETIRO 7 días antes del sacrificio.

Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.32.N.1404

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeutas

Antibacterianos (antibióticos)
Quinolonas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/ciprodrog-20/>

Drogavet

