

## CIPRODROG INY®

Solución Inyectable



### Composición

Ciprofloxacina 7.5 g

### Indicaciones

CIPRODROG INY está indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias, digestivas, urogenitales y de la piel. Bovinos: Neumonías, bronconeumonías, diarreas, Colibacilosis, Pasteurelosis, mastitis, dermatitis y Micoplasmosis. Porcinos: Colibacilosis, pleuroneumonías, diarreas, síndrome MMA. Aves: Coriza, Micoplasmosis, Cólera, Salmonelosis, Colisepticemia, ERC y Estafilococosis.

### Dosis

Bovinos: 1 ml de CIPRODROG INY / 30 kg p.v. / día, durante 5 días (2,5 mg Ciprofloxacina / kg p.v. / día). Porcinos: 1 ml de CIPRODROG INY / 20 kg p.v. / día, durante 3 a 5 días (3,75 mg Ciprofloxacina / kg p.v. / día). Aves: 1 ml de CIPRODROG INY / 15 kg p.v. / día, durante 3 a 5 días (5 mg Ciprofloxacina / kg p.v. / día). PERIODO DE RETIRO: Bovinos: 14 días Porcinos: 10 días Aves: 5 días Leche: 48 horas después del último tratamiento.

### Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular

### Países

Perú SENASA F.03.01.N.1096

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)  
Quinolonas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/ciprodrog-iny/>

## Drogavet

