CIPRODROG INY®

Drogavet

Solución Inyectable



Composición

Ciprofloxacina 7.5 g

Indicaciones

CIPRODROG INY está indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias, digestivas, urogenitales y de la piel. Bovinos: Neumonías, bronconeumonías, diarreas, Colibacilosis, Pasteurelosis, mastitis, dermatitis y Micoplasmosis. Porcinos: Colibacilosis, pleuroneumonías, diarreas, síndrome MMA. Aves: Coriza, Micoplasmosis, Cólera, Salmonelosis, Colisepticemia, ERC y Estafilococosis.



Dosis

Bovinos: 1 ml de CIPRODROG INY / 30 kg p.v. / día, durante 5 días (2,5 mg Ciprofloxacina / kg p.v. / día). Porcinos: 1 ml de CIPRODROG INY / 20 kg p.v. / día, durante 3 a 5 días (3,75 mg Ciprofloxacina / kg p.v. / día). Aves: 1 ml de CIPRODROG INY / 15 kg p.v. / día, durante 3 a 5 días (5 mg Ciprofloxacina / kg p.v. / día). PERIODO DE RETIRO: Bovinos: 14 días Porcinos:10 días Aves: 5 días Leche: 48 horas después del último tratamiento.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vias Administración

Parenteral Intramuscular

Paises

Perú SENASA F.03.01.N.1096

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Quinolonas

Web Site

http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/ciprodrog-iny/

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com