

COLISDROG®

Premix



Composición

Colistina, sulfato 7.5 g

Indicaciones

Es efectivo frente a Pseudomona aeruginosa, especies de Klebsiella, especies de Aerobacter, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pasteurella multocida y Salmonella spp. Su uso está recomendado como promotor de crecimiento y para la prevención y tratamiento de enteritis bacterianas en aves y porcinos, causados por microorganismos sensibles al sulfato de colistina.

Dosis

Administrar vía oral en el alimento o agua de bebida. Promotor de crecimiento: 20 a 41 mg de COLISDROG® / kg p.v. o 200 a 410 g de COLISDROG® / tonelada de alimento, de manera continua durante 7 días. Tratamiento: Agua: 82 mg de COLISDROG® / kg p.v., o 0.82 g / litro de agua de bebida constante durante 3 días. Alimento: 1 kg de COLISDROG® / tonelada durante 7 días. Casos severos: 1.6 kg de COLISDROG® / tonelada durante 7 días. Correspondiente a: Aves: 123.000 UI de Sulfato de Colistina / kg p.v. / día. Porcinos: 102.500 UI de Sulfato de Colistina / kg p.v. / día. PERIODO DE RETIRO Aves y porcinos: 07 días

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 100 g, Saco 20 kg, Bolsa 1 kg,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.20.N.1238

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeutas

Antibacterianos (antibióticos)
Otros antibióticos

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/colisdrog>

Drogavet

