

## COLISDROG ®

Premix



### Composición

Colistina, sulfato 7.5 g

### Indicaciones

Es efectivo frente a *Pseudomonas aeruginosa*, especies de *Klebsiella*, especies de *Aerobacter*, *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Pasteurella multocida* y *Salmonella spp.* Su uso está recomendado como promotor de crecimiento y para la prevención y tratamiento de enteritis bacterianas en aves y porcinos, causados por microorganismos sensibles al sulfato de colistina.

### Dosis

Administrar vía oral en el alimento o agua de bebida. Promotor de crecimiento: 20 a 41 mg de COLISDROG® / kg p.v. o 200 a 410 g de COLISDROG® / tonelada de alimento, de manera continua durante 7 días. Tratamiento: Agua: 82 mg de COLISDROG® / kg p.v., o 0.82 g / litro de agua de bebida constante durante 3 días. Alimento: 1 kg de COLISDROG® / tonelada durante 7 días. Casos severos: 1.6 kg de COLISDROG® / tonelada durante 7 días. Correspondiente a: Aves: 123.000 UI de Sulfato de Colistina / kg p.v. / día. Porcinos: 102.500 UI de Sulfato de Colistina / kg p.v. / día. PERÍODO DE RETIRO Aves y porcinos: 07 días

### Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 100 g, Saco 20 kg, Bolsa 1 kg,

### Vías Administración

Oral

### Paises

Perú SENASA F.03.20.N.1238

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeúticas

Antibacterianos (antibioticos)  
Otros antibióticos

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/colisdrog>

## Drogavet

