

## COLISDROG® 10

Premix



### Composición

Colistina, sulfato 10 g

### Indicaciones

Efectivo frente a *Pseudomona aeruginosa*, especies de *Klebsiella*, especies de *Aerobacter*, *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Pasteurella multocida* y *Salmonella spp.* Recomendado como promotor de crecimiento y, para la prevención y tratamiento de enteritis bacterianas sensibles en aves y porcinos.

### Dosis

Vía oral en el alimento o agua de bebida. - Promotor: 15 mg de COLISDROG® 10 / kg p.v. o 150 g de COLISDROG® 10 / tonelada de manera continua. - Preventivo: 30.75 mg de COLISDROG® 10 / kg p.v. o 307.5 g COLISDROG® 10 / tonelada durante 7 días. - Tratamiento: • Agua: 61.5 mg de COLISDROG® 10 / kg p.v. o 0.615 g de COLISDROG® 10 / litro de agua de bebida durante 3 días. • Alimento: 0.75 kg de COLISDROG® 10 / tonelada durante 7 días. • Casos Severos: 1.2 kg de COLISDROG® 10 / tonelada durante 7 días. PERIODO DE RETIRO Aves y porcinos: 7 días Huevos: 0 días.

### Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.03.70.N.1739

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Estimulantes Y Reconstituyentes  
Reconstituyentes

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/colisdrog-10/>

Drogavet

