COLISDROG® 10

Drogavet

Premix

Composición

Colistina, sulfato 10 g

Indicaciones

Efectivo frente a Pseudomona aeruginosa, especies de Klebsiella, especies de Aerobacter, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pasteurella multocida y Salmonella spp. Recomendado como promotor de crecimiento y, para la prevención y tratamiento de enteritis bacterianas sensibles en aves y porcinos.

Dosis

Vía oral en el alimento o agua de bebida. - Promotor: 15 mg de COLISDROG® 10 / kg p.v. o 150 g de COLISDROG® 10 / tonelada de manera continua. - Preventivo: 30.75 mg de COLISDROG® 10 / kg p.v. o 307.5 g COLISDROG® 10 / tonelada durante 7 días. - Tratamiento: • Agua: 61.5 mg de COLISDROG® 10 / kg p.v. o 0.615 g de COLISDROG® 10 / litro de agua de bebida durante 3 días. • Alimento: 0.75 kg de COLISDROG® 10 / tonelada durante 7 días. • Casos Severos: 1.2 kg de COLISDROG® 10 / tonelada durante 7 días. PERIODO DE RETIRO Aves y porcinos: 7 días Huevos: 0 días.



Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.03.70.N.1739

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Estimulantes Y Reconstituyentes
Reconstituyentes

Web Site

http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/colisdrog-10/

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com