

DEXADROG®

Solución Inyectable



Composición

DEXAMETASONA 21-PIRIDIN CARBOXILATO 100 mg Dexametasona, (21) fosfato sódica 50 mg

Indicaciones

 Procesos inflamatorios por enfermedades respiratorias, músculo-esqueléticas, gastrointestinales, patologías de la glándula mamaria, traumatismos.
Alergias por medicamentos, dermatitis alérgica, urticaria, picaduras de insectos, eczemas.
Trastornos metabólicos, cetosis bovina.

Dosis

0,02 a 0,08 ml de DEXADROG / kg p.v. Dosis referencial: Bovinos adultos: 10 ml / animal Terneros y ovinos: 3 a 5 ml / animal Porcinos: 2 a 5 ml / animal PERIODO DE RETIRO: Carne: 21 días. Leche: 3 días

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vias Administración

Parenteral Intramuscular Parenteral Subcutáneo

Paises

Perú SENASA F.06.01.N.0128

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antiinflamatorios Esteroidales sistémicos

Web Site

Drogavet



