

## DEXADROG®

### Solución Inyectable



### Composición

DEXAMETASONA 21-PIRIDIN CARBOXILATO 100 mg  
Dexametasona, (21) fosfato sódica 50 mg

### Indicaciones

- Procesos inflamatorios por enfermedades respiratorias, músculo-esqueléticas, gastrointestinales, patologías de la glándula mamaria, traumatismos.
- Alergias por medicamentos, dermatitis alérgica, urticaria, picaduras de insectos, eczemas.
- Trastornos metabólicos, cetosis bovina.

### Dosis

0,02 a 0,08 ml de DEXADROG / kg p.v. Dosis referencial: Bovinos adultos: 10 ml / animal Terneros y ovinos: 3 a 5 ml / animal  
Porcinos: 2 a 5 ml / animal PERÍODO DE RETIRO: Carne: 21 días.  
Leche: 3 días

### Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular  
Parenteral Subcutáneo

### Paises

Perú SENASA F.06.01.N.0128

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeúticas

Antiinflamatorios  
Esteroidales sistémicos

### Web Site

## Drogavet

