

## DIAEROM-N

### Suspensión Oral



### Composición

Caolín 15 g  
Neomicina, sulfato 15 g  
Pectina 0.44 g

### Indicaciones

Está indicado para aves, porcinos, bovinos y equinos en el tratamiento de procesos diarreicos agudos de origen bacteriano producidos por cepas susceptibles de Escherichia coli, Salmonella, Brachyspira hyodysenteriae, Klebsiella, Proteus. Coadyuvante en el tratamiento de diarreas inespecíficas e intoxicaciones alimentarias.

### Dosis

Administrar por vía oral. - Pollos, gallinas, pavos, patos: Diluir 1 mL de DIAEROM-N por litro de agua de bebida constante, o también 0.1 mL de DIAEROM-N / kg p.v. por día, durante 3 a 5 días. - Lechones, terneros y potrillos: Administrar sin diluir 0.1 a 0.15 mL de DIAEROM-N / kg p.v. cada 12 horas. El tratamiento puede continuar 24 a 48 horas después de la remisión de los signos clínicos, pero sin exceder un total de 14 días consecutivos. PERIODO DE RETIRO Pollos, gallinas, pavos, patos y lechones: 0 días Terneros: 4 días Huevos: 0 días

### Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.03.02.N.1776

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Agentes De Uso Múltiple  
Antidiarreicos  
Antibacterianos (antibióticos)  
Aminoglucosidos

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/diaerom-n/>

## Drogavet

