

DOXIDROG -50®

Polvo Soluble



Composición

DOXICICLINA, CLORHIDRATO 50 g

Indicaciones

Aves: Enfermedad respiratoria crónica causada por Mycoplasma gallisepticum y complicada por la presencia de Escherichia coli. Casos de colibacilosis, sinovitis infecciosa, cólera y cresta azul. Porcinos, bovinos, caprinos y ovinos: Neumonía bacteriana, septicemia hemorrágica, leptospirosis, anaplasmosis, piroplasmosis, enteritis, difteria, ántrax, prostatitis, brucelosis, pasteurellosis, carbunco sintomático, aborto enzoótico, infecciones del aparato genital, ehrlichiosis, erisipela, diarreas bacterianas, mastitis y metritis.

Dosis

Vía oral en el agua de bebida. Aves: - Agua de bebida: 0.4 g de DOXIDROG-50® por litro de agua constante, o 40 mg de DOXIDROG-50® por kg p.v. por día, o 1 g de DOXIDROG-50® por 25 kg p.v., durante 3 a 5 días. - Alimento: 800 g de DOXIDROG-50® por tonelada, durante 5 a 7 días. Porcinos, bovinos, caprinos y ovinos: - Agua de bebida: 0.2 g de DOXIDROG-50® por litro de agua, o 1 g de DOXIDROG-50® por 50 kg p.v., durante 3 a 5 días. PERIODO DE RETIRO: Carne: 7 días.

Presentaciones

Saco 20 kg, Saco 10 kg, Bolsa 1 kg, Pote 100 g, Sobre 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.04.N.0733

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Tetracilinas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/doxidrog-50/>

Drogavet

