

## DOXIDROG 20®

Solución Oral



### Composición

Doxiciclina 20 g

### Indicaciones

Indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas (Bacillus anthracis, Clostridium spp., Pasteurella spp., Campylobacter spp., Haemophilus spp., Klebsiella spp., Spherophorus necrophorus, Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Actinobacillus spp., Actinomyces bovis, Leptospira pomona, Moraxella bovis, Erysipelothrix insidiososa, Corynebacterium spp., Listeria spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp.) y microorganismos de los grupos Chlamydiae, Mycoplasmataceae y Rickettsiaceae (Anaplasma spp.).

### Dosis

Administrar Vía oral en el agua de bebida: Aves: 0.5 mL de DOXIDROG 20® / litro de agua de bebida constante o 0.1 mL de DOXIDROG 20® / kg p.v. / día, durante 3 a 5 días Porcinos: 1 mL de DOXIDROG 20® / 20 kg p.v. / día, durante 5 días o 0.05 mL de DOXIDROG 20® / kg p.v. / día, durante 5 días. PERIODO DE RETIRO Aves y Porcinos: 7 días.

### Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.03.02.N.0739

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeutas

Antibacterianos (antibióticos)  
Tetracilinas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/doxidrog-l/>

Drogavet

