

## DOXIDROG C-PLUS®

Polvo Soluble



### Composición

Ciprofloxacina 0 g  
Doxiciclina 0 g

### Indicaciones

Enfermedad respiratoria crónica, micoplasma, colibacilosis, sinovitis infecciosa, cresta azul, cólera aviar, colisepticemia, coriza contagiosa, pasteurellosis, pseudomoniasis, salmonelosis, infecciones por estafilococos y Erysipelothrix sp.

### Dosis

Vía oral en el agua de bebida. Aves y porcinos: 50 a 100 mg de DOXIDROG C-PLUS® / kg p.v. / día, durante 3 a 5 días. 1 kg de DOXIDROG C-PLUS® / 1000 litros de agua constante, durante 3 a 5 días. PERIODO DE RETIRO Aves y Porcinos: 7 días. No administrar en gallinas de postura.

### Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Saco 10 kg, Saco 5 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.03.26.N.1316

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/doxidrog-c-plus/>

Drogavet



IMAGEN NO  
DISPONIBLE