

DOXIDROG L®

Solución Oral



Composición

Doxiciclina 10 g

Indicaciones

Su espectro de acción comprende bacterias Gram negativas, Gram positivas, Micoplasmas, algunos anaerobios como Clostridium spp, rickettsias, clamidias y algunos protozoos. • Aves: Micoplasma, E.R.C., Colibacilosis y Pasteurelosis. • Porcinos: Neumonía, pleuroneumonía y diarreas.

Dosis

Vía oral en el agua de bebida. • Aves: 1 - 2 ml de DOXIDROG L/ litro de agua de bebida o 0,2 ml de DOXIDROG L / kg p.v./día, por 3 a 5 días. • Porcinos: 1 ml de DOXIDROG L/10 kg p.v./día durante 5 días o 0,1 ml / kg p.v. / día (10 mg/ kg p.v.) PERIODO DE RETIRO: 5 días antes del sacrificio. No administrar en gallinas de postura.

Presentaciones

Frasco 20 L, Frasco 5 L, Frasco 1 L, Frasco 100 mL,

Vías Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.03.02.N.0969

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Tetracilinas

Web Site

Drogavet

