

DROMOXIL

Premix



Composición

Amoxicilina, trihidrato 60 g

Indicaciones

Está indicado en aves y porcinos para el tratamiento de la salmonelosis, colibacilosis, coriza infecciosa, enfermedad respiratoria crónica, artritis bacteriana, pasteurelosis y clostridiosis.

Dosis

Vía oral en el agua de bebida según instrucciones o mezclado con el alimento. Aves: 42 mg de DROMOXIL / kg p.v. / día durante 3 a 5 días, o 1 g de DROMOXIL / 24 kg p.v./ día, o 84 g de DROMOXIL / 200 litros de agua de bebida constante.

INSTRUCCIONES DEL DILUYENTE: 1. En una parte del agua de bebida, prepara el diluyente de forma proporcional a la cantidad de DROMOXIL a utilizar. Cada sobre de 120 g sirve para preparar 1 kg de producto. 2. En la otra parte del agua de bebida a medicar, agregar el total de DROMOXIL a utilizar. 3. Finalmente, adicionar de forma lenta y con agitación el "DILUYENTE preparado" a la parte de agua que contiene el DROMOXIL, hasta conseguir la total transparencia del agua. Porcinos: 200 a 400 ppm de DROMOXIL en el alimento durante la etapa de post destete (4 semanas). No usar diluyente. PERÍODO DE RETIRO Aves: 7 días. Porcinos: 15 días.

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Saco 10 kg, Saco 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g, Pote 100 g,

Vías Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.03.04.N.0750

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/dromoxil/>

Drogavet



IMAGEN NO
DISPONIBLE