

ENRODROG® 20

Solución Inyectable



Composición

Enrofloxacina 20 g

Indicaciones

ENRODROG® 20 es una fluoroquinolona de excelente actividad bactericida y amplio espectro de acción que abarca bacterias Gram positivas, Gram negativas y micoplasmas. Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: Tratamiento de infecciones como neumonías, bronconeumonías, diarreas, colibacilosis, pasteurellosis, mastitis, dermatitis y micoplasmosis. Porcinos: Tratamientos de diarreas, colenterotoxemias, salmonelosis, pleuroneumonías, síndrome MMA y rinitis atrófica. Aves (pollos, gallinas y pavos): Tratamiento de ERC, coriza, micoplasmosis, cólera, salmonelosis, colisepticemia y estafilococosis. Caninos y felinos: Tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas, urogenitales y de piel.

Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL / 40 kg p.v. / 3 a 5 días, vía intramuscular o subcutánea (5 mg P.A. / kg p.v.). Porcinos: 1 mL / 80 kg p.v. / 3 días, vía intramuscular (2.5 mg P.A. / kg p.v.). Aves (pollos, gallinas y pavos): 1 mL / 20 kg p.v. / 3 días, vía subcutánea (10 mg P.A. / kg p.v.). Caninos y felinos: 0.1 mL / 4 kg p.v. / 3 días, vía subcutánea o intramuscular (5 mg P.A. / kg p.v.).
PERÍODO DE RETIRO: Carne: 7 días, Pavos: 10 días.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.21.01.N.0038

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Quinolonas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/enrodrog-20/>

Drogavet

