ENROFLYN 20%

Drogavet

Solución Oral



Composición

Enrofloxacina 20 g

Indicaciones

Indicado en porcicultura y avicultura (pollos de engorde, pollitos, pollonas y pavos) para el tratamiento y control de infecciones causadas por gérmenes como Mycoplasma spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Escherichia coli, Pseudomona spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Proteus spp., Salmonella spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Corynebacterium spp., Bacillus spp., Erysipelothrix spp., Fusobacterium spp., Klebsiella spp., Listeria spp., Moraxella spp., Serratia spp., Shigella spp., Yersinia spp. y Vibrio spp.

Dosis

Vía oral en el agua de bebida 0.25 mL de ENROFLYN 20% / litro de agua de bebida constante. Aves:1 mL de ENROFLYN 20% / 20 kg p.v. / 3 a 5 días. Porcinos: 1 mL de ENROFLYN 20% / 40 kg p.v. / 3 a 5 días. PERIODO DE RETIRO Aves (Pollos, Gallinas y pavos) y Porcinos: 7 días Pavos: 10 días. No administrar a gallinas productoras de huevo para consumo humano.

Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.03.02.N.0701

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Web Site

http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/enroflyn-20/

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com