

ENROFLYN10%®

Solución Oral



Composición

Enrofloxacin 10 g

Indicaciones

indicado en porcicultura y avicultura (pollos de engorde, pollitos, pollonas y pavos) para el tratamiento y control de infecciones causadas por gérmenes como Mycoplasma spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Escherichia coli, Pseudomona spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Proteus spp., Salmonella spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Corynebacterium spp., Bacillus spp., Erysipelothrix spp., Fusobacterium spp., Klebsiella spp., Listeria spp., Moraxella spp., Serratia spp., Shigella spp., Yersinia spp. y Vibrio spp.

Dosis

Vía oral en el agua de bebida. Aves: Menores de 4 semanas: 0.5 mL de ENROFLYN 10%® / litro de agua de bebida constante durante 3 a 5 días. Equivalente a 50 ppm. Mayores de 4 semanas: 1 mL de ENROFLYN 10%® / 10 kg p.v. durante 3 a 5 días. Equivalente a 10 mg / kg p.v. Porcinos: 0.5 mL de ENROFLYN 10%® / litro de agua de bebida constante o 1 mL de ENROFLYN 10%® / 20 kg p.v. durante 3 a 5 días. PERÍODO DE RETIRO Aves (pollos, gallinas y patos) y porcinos: 7 días. Pavos: 10 días. No administrar en animales en producción de huevos para consumo humano.

Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.02.N.0702

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/enroflyn-10/>

Drogavet

