

ENROFLYN10% ®

Drogavet

Solución Oral



 Laboratorios DROGAVET

Composición

Enrofloxacina 10 g

Indicaciones

indicado en porcicultura y avicultura (pollos de engorde, pollitos, pollonas y pavos) para el tratamiento y control de infecciones causadas por gérmenes como *Mycoplasma spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Bordetella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Bacillus spp.*, *Erysipelothrix spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Klebsiella spp.*, *Listeria spp.*, *Moraxella spp.*, *Serratia spp.*, *Shigella spp.*, *Yersinia spp.* y *Vibrio spp.*

Dosis

Vía oral en el agua de bebida. Aves: Menores de 4 semanas: 0.5 mL de ENROFLYN 10%® / litro de agua de bebida constante durante 3 a 5 días. Equivalente a 50 ppm. Mayores de 4 semanas: 1 mL de ENROFLYN 10%® / 10 kg p.v. durante 3 a 5 días. Equivalente a 10 mg / kg p.v. Porcinos: 0.5 mL de ENROFLYN 10%® / litro de agua de bebida constante o 1 mL de ENROFLYN 10%® / 20 kg p.v. durante 3 a 5 días. PERÍODO DE RETIRO Aves (pollos, gallinas y patos) y porcinos: 7 días. Pavos: 10 días. No administrar en animales en producción de huevos para consumo humano.



Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vías Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.03.02.N.0702

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/enroflynn-10/>