

FLORFENIDROG®-F5

Premix



Composición

Florfenicol 5 g
Fosfomicina 5 g

Indicaciones

Está indicado en aves y porcinos contra gérmenes sensibles a la Fosfomicina y al Florfenicol como la Escherichia coli, Pasteurella spp., Streptococcus spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp., Mycoplasma spp.

Dosis

En el alimento como: Promotor de Crecimiento: 0.5 a 1 kg FLORFENIDROG®-F5 / tonelada de alimento en forma constante.
Control : 1 a 2kg FLORFENIDROG®-F5 / tonelada de alimento durante 7 a 10 días. PERIODO DE RETIRO Porcinos: 28 días.
Aves: 05 días.

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.70.N.1714

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/florfenidrog-f5/>

Drogavet



IMAGEN NO
DISPONIBLE