

## FLORFENIDROG®-F5

Premix



### Composición

Florfénicol 5 g  
Fosfomicina 5 g

### Indicaciones

Está indicado en aves y porcinos contra gérmenes sensibles a la Fosfomicina y al Florfénicol como la Escherichia coli, Pasteurella spp., Streptococcus spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp., Mycoplasma spp.

### Dosis

En el alimento como: Promotor de Crecimiento: 0.5 a 1 kg FLORFENIDROG®-F5 / tonelada de alimento en forma constante. Control : 1 a 2kg FLORFENIDROG®-F5 / tonelada de alimento durante 7 a 10 días. PERÍODO DE RETIRO Porcinos: 28 días. Aves: 05 días.

### Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

### Vías Administración

Oral

### Paises

Perú SENASA F.03.70.N.1714

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/florfenidrog-f5/>

Drogavet



IMAGEN NO  
DISPONIBLE