

## FLUNIDROG®

Solución Inyectable



### Composición

Flunixin meglumina 5 g

### Indicaciones

Analgésico, antipirético y antiinflamatorio para el tratamiento de desórdenes músculo-esqueléticos como cojeras, artritis, tendinitis, esguinces, laminitis; síndrome de vaca caída, cólicos en equinos y porcinos, síndrome MMA.

### Dosis

Vía intramuscular y endovenosa, máximo durante 5 días.  
Bovinos: 2.2 mL de FLUNIDROG® / 50 kg p.v. / día. Equinos: 1.1 mL de FLUNIDROG® / 50 kg p.v. / día. Porcinos: 2.2 mL de FLUNIDROG® / 50 kg p.v. / día. PERIODO DE RETIRO Bovinos: 10 días. Porcinos: 21 días. Leche: 3 días.

### Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular  
Parenteral Intravenoso

### Países

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/flunidrog/>

Drogavet

