FLUNIDROG®

Drogavet

Solución Inyectable



## Composición

Flunixina meglumina 5 g

## Indicaciones

Analgésico, antipirético y antiinflamatorio para el tratamiento de desórdenes músculo-esqueléticos como cojeras, artritis, tendinitis, esguinces, laminitis; síndrome de vaca caída, cólicos en equinos y porcinos, síndrome MMA.

## Dosis

Vía intramuscular y endovenosa, máximo durante 5 días. Bovinos: 2.2 mL de FLUNIDROG® / 50 kg p.v. / día. Equinos: 1.1 mL de FLUNIDROG® / 50 kg p.v. /día. Porcinos: 2.2 mL de FLUNIDROG® / 50 kg p.v. / día. PERIODO DE RETIRO Bovinos: 10 días. Porcinos: 21 días. Leche: 3 días.

## Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

## Vias Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Intravenoso

## Paises

## Clase ACTVET

## Clases Farmacoterapeuticas

## Web Site

http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/flunidrog/




Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com