

## FOSFODROG- L

Solución Oral



### Composición

Fosfomicina sódica 10 g

### Indicaciones

Aves: Colibacilosis, septicemia, coriza infecciosa, síndrome de cabeza hinchada, onfalitis, cólera aviar, tifoidea aviar y artritis bacteriana. Porcinos: Colibacilosis, salmonelosis, complejo respiratorio porcino, pleuroneumonía, artritis bacteriana, erisipela, infecciones intestinales, cistitis, pielonefritis y metritis.

### Dosis

Vía oral en el agua de bebida. Aves y porcinos: 1 mL de FOSFODROG® L / litro de agua el primer día, posteriormente 0.5 mL de FOSFODROG® L / litro de agua constante por 3 a 5 días o 1 mL de FOSFODROG® L / 10 kg p.v., por día (correspondiente a 10 mg de fosfomicina / kg p.v.), durante 3 a 5 días consecutivos. PERÍODO DE RETIRO Carne: 48 horas Huevo: 24 horas

### Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeutas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/fosfodrog-l/>

Drogavet

