

FOSFODROG C

Solución Oral



Composición

Ciprofloxacina 10 g
Enrofloxacina sódica 10 g

Indicaciones

Aves: Colibacilosis, aerosaculitis, tifoidea aviar, coriza, E.R.C., y artritis bacteriana. Porcinos: Colibacilosis, salmonelosis, complejo respiratorio porcino, pleuroneumonía, artritis bacteriana, erisipela, infecciones intestinales, cistitis, pielonefritis y metritis.

Dosis

Vía oral en el agua de bebida. 1 mL de FOSFODROG® C / litro de agua constante o 1 mL de FOSFODROG® C / 10 kg p.v. el primer día, luego administrar 0.5 mL de FOSFODROG® C / litro de agua de bebida o 100 mg del producto por kg p.v. en dosis pulso por 3 a 5 días a criterio del médico veterinario responsable. PERÍODO DE RETIRO Carne: 7 días. Huevo: 48 horas

Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.32.N.1405

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/fosfodrog-c/>

Drogavet

