

## FOSFODROG-T ®

Premix



### Composición

Fosfomicina sódica 10 g  
Trimetoprim 2.5 g

### Indicaciones

Aves (pollos de engorde, pollas de reemplazo y reproductoras): Tratamiento de coriza infecciosa, colibacilosis, aerosaculitis, tifoidea aviar, cólera aviar, enfermedad respiratoria crónica y artritis bacteriana. Cerdos (Lechones, cerdos de engorda y reproductores): Procesos infecciosos de los cerdos en su fase aguda o crónica respiratorios, ocasionados por microorganismos patógenos sensibles como Pasteurelosis, Actinobacilosis, Haemophilus, Salmonelosis, Colibacilosis, Enteritis y Estafilococosis.

### Dosis

Vía oral en el agua de bebida o mezclado con el alimento. Agua de bebida: Preparación diaria, durante 3 a 5 días. 100 mg de FOSFODROG-T® / kg p.v. por día o 1 g de FOSFODROG-T® / litro de agua. Alimento: 2 kg de FOSFODROG-T® / tonelada, durante 5 a 7 días. PERÍODO DE RETIRO Carne: 5 días

### Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Balde 2 g,

### Vías Administración

Oral

### Paises

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/fosfodrog-t/>

## Drogavet

