

## FOSFOTILDROG ®

### Solución Oral



### Composición

Fosfomicina 10 g  
Tilosina, tartrato 5 g

### Indicaciones

Aves: E.R.C., micoplasmosis, síndromes respiratorios, colibacilosis septicémica, coriza infecciosa, síndrome de cabeza hinchada, onfalitis, cólera aviar, tifoidea aviar, artritis bacteriana. Porcinos: Colibacilosis, salmonelosis, complejo respiratorio porcino, pleuroneumonía, neumonías, artritis bacteriana, erisipela, infecciones intestinales, cistitis, pielonefritis, metritis.

### Dosis

Vía oral en el agua de bebida. Aves y porcinos: 1 mL de FOSFOTILDROG® / litro de agua el primer día y posteriormente 0.5 mL de FOSFOTILDROG® / litro de agua o 0.1 mL de FOSFOTILDROG® / kg p.v. por día, durante 3 a 5 días.

PERÍODO DE RETIRO Aves y porcinos: 5 días No administrar a animales productores de huevos para consumo humano.

### Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

### Vías Administración

Oral

### Paises

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeuticas

### Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/fosfotildrog/>

## Drogavet



IMAGEN NO  
DISPONIBLE