

HEAT 4L ®

Premix



Composición

Sulfamonometoxina 800 g
Trimetoprim 200 g

Indicaciones

Aves: Coccidiosis (*Eimeria tenella*, *Eimeria acervulina*, *Eimeria máxima*, *Eimeria brunetti*), coriza infecciosa (*Avibacterium paragallinarum*), E.R.C. (*Mycoplasma gallisepticum*), estafilococosis (*Staphylococcus aureus*), pullorosis (*Salmonella pullorum*), colibacilosis (*Escherichia coli*). Bovinos: Colibacilosis, coccidiosis y neumonía bacteriana. Porcinos: Colibacilosis, toxoplasmosis y rinitis atrófica.

Dosis

Vía oral en el agua de bebida o en el alimento. Aves (pollos, gallinas, pavos): 40 a 50 g de HEAT 4L® / 200 litros de agua de bebida constante o 20 a 25 mg de HEAT 4L® / kg p.v. por día, durante 5 días. Bovinos y porcinos: En agua, leche o en la ración diaria: 15 mg – 20 mg HEAT 4L® / kg p.v. cada 12 horas, durante 5 días. En el alimento: 400 – 500 g HEAT 4L® / tonelada de alimento. PERÍODO DE RETIRO Aves y bovinos: 10 días. Porcinos: 15 días.

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.03.20.N.1402

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeúticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/heat-4l/>

Drogavet



IMAGEN NO
DISPONIBLE