

IVERDROG 1.5®

Solución Inyectable



Composición

Ivermectina 0.15 g

Indicaciones

Antiparasitario inyectable para el control y tratamiento de parasitosis internas y externas en: BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS: Parásitos gastrointestinales: Haemonchus sp., Ostertagia ostertagi, Ostertagia lyrata, Trichostrongylus sp., Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus, Nematodirus helveticus, Nematodirus spathiger, Toxocara vitulorum y Trichuris spp. Parásitos pulmonares: Dictiocaulus viviparus, Dictiocaulus filaria. Ectoparásitos: Sarcoptes sp., Haematopinus sp., Dermatobia hominis, Boophilus microplus, Cochliomyia hominivorax, Linognathus vituli, Psoroptes spp. También está indicado como auxiliar en el control de la población de la mosca de los cuernos (Haematobia irritans) y como preventivo de miasis en el ombligo de terneros recién nacidos y en las heridas de castración. PORCINOS: Parásitos gastrointestinales: Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ramsoni.

Dosis

Vía subcutánea en dosis única. Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 0.2 mg de ivermectina / kg p.v., equivalente a 1 mL de IVERDROG 1.5® / 75 kg p.v. Porcinos: 0.3 mg de ivermectina / kg p.v., equivalente a 1 mL IVERDROG 1.5® / 50 kg p.v. PERÍODO DE RETIRO Bovinos y Camélidos Sudamericanos: 35 días. Ovinos y Caprinos: 28 días. Porcinos: 19 días. No usar en ganado lechero en lactación ni 28 días antes del parto.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Subcutáneo

Paises

Perú SENASA F.54.01.N.0078

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/iver-drog-1-5/>

Drogavet

