

IVERDROG 1.5®

Solución Inyectable



Composición

Ivermectina 0.15 g

Indicaciones

Antiparasitario inyectable para el control y tratamiento de parasitosis internas y externas en: BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS: Parásitos gastrointestinales: *Haemonchus* sp., *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Trichostrongylus* sp., *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Toxocara vitulorum* y *Trichuris* spp. Parásitos pulmonares: *Dictiocaulus viviparus*, *Dictiocaulus filaria*. Ectoparásitos: *Sarcoptes* sp., *Haematopinus* sp., *Dermatobia hominis*, *Boophilus microplus*, *Cochliomyia hominivorax*, *Linognathus vituli*, *Psoroptes* spp. También está indicado como auxiliar en el control de la población de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) y como preventivo de miasis en el ombligo de terneros recién nacidos y en las heridas de castración. PORCINOS: Parásitos gastrointestinales: *Ascaris suum*, *Hyostrogylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides ramsoni*.

Dosis

Vía subcutánea en dosis única. Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 0.2 mg de ivermectina / kg p.v., equivalente a 1 mL de IVERDROG 1.5® / 75 kg p.v. Porcinos: 0.3 mg de ivermectina / kg p.v., equivalente a 1 mL IVERDROG 1.5® / 50 kg p.v. PERIODO DE RETIRO Bovinos y Camélidos Sudamericanos: 35 días. Ovinos y Caprinos: 28 días. Porcinos: 19 días. No usar en ganado lechero en lactación ni 28 días antes del parto.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.54.01.N.0078

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/iver-drog-1-5/>

Drogavet

