

IVERDROG-P

Premix



Composición

Ivermectina 0.25 g

Indicaciones

IVERDROG-P está indicado en aves para la prevención y tratamiento de parasitosis internas y externas. - Parasitosis interna: lombrices intestinales. • Ascaridia spp. • Capillaria spp. • Heterakis spp. • Syngamus trachea. - Parasitosis externa: ácaros y piojos. • Goniocotes gallinae, piojo pequeño del plumón del pollito. • Goniodes gigas, piojo grande del cuerpo del pollo. • Lipeuros caponis, piojo de las plumas de las alas. • Dermanyssus gallinae, ácaro rojo del gallinero. - Vectores: escarabajo. • Alphitobius diaperinus, escarabajo de la cama o escarabajo negro.

Dosis

Administrar vía oral mezclado con el alimento. 40 mg de IVERDROG-P por kg de peso vivo, durante 7 días consecutivos en aves de cualquier peso y edad. Equivale a 1 kg de IVERDROG-P por tonelada de alimento. PERIODO DE RETIRO Aves: 3 días

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.54.70.N.0187

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/iverdrog-p/>

Drogavet

