

IVERDROG-P12

Premix



Composición

Ivermectina 1.2 g

Indicaciones

IVERDROG-P12 está indicado en aves para la prevención y tratamiento de parasitosis internas y externas. - Parasitosis interna: lombrices intestinales. • Ascaridia spp. • Capillaria spp. • Heterakis spp. • Syngamus trachea. - Parasitosis externa: ácaros y piojos. • Goniocotes gallinae, piojo pequeño del plumón del pollito. • Goniodes gigas, piojo grande del cuerpo del pollo. • Lipeurus caponis, piojo de las plumas de las alas. • Dermanyssus gallinae, ácaro rojo del gallinero. - Vectores: escarabajo. • Alphitobius diaperinus, escarabajo de la cama o escarabajo negro.

Dosis

Administrar vía oral, en el alimento. - Pollos de engorde: • 250 a 420 g / tonelada durante los primeros 21 días de edad, para el control del escarabajo. - Pollas en levante: • 167 g / tonelada en la semana 3ra, 4ta y 5ta. Descanso en la semana 6ta. • 167 g / tonelada en la semana 7ma, 8va y 9na. Descanso en la semana 10ma. • 167 g / tonelada en la semana 11va, 12va y 13va. Término del tratamiento. - Ponedoras en producción: • 250 g / tonelada en 3 ciclos de 21 días con intervalos de una (1) semana. PERÍODO DE RETIRO Carne y Huevo: 5 días

Presentaciones

Saco 25 kg, Saco 20 kg, Saco 15 kg, Pote 100 g, Bolsa 10 kg, Bolsa 5 kg, Bolsa 1 kg, Bolsa 100 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.54.70.N.0188

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Web Site

<http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/iverdrog-p12/>

Drogavet

